


Les rendez-vous des Vaccins

Juin 2016



Quels vaccins va recevoir votre enfant ?

à 2 mois

- Vaccin HEXYON®
- Vaccin SYNFLORIX®
- Vaccin ROTAVIRUS

à 3 mois

- Vaccin HEXYON®
- Vaccin ROTAVIRUS

à 4 mois

- Vaccin HEXYON®
- Vaccin SYNFLORIX®
- (Vaccin ROTAVIRUS)

à 12 mois

- Vaccin SYNFLORIX®
- Vaccin RRO

à 15 mois

- Vaccin HEXYON®
- Vaccin MÉNINGOCOQUE C

5-6 ANS :
le prochain rendez-vous vaccinal de votre enfant.

Merci aux femmes de la
Maison de Quartier d'Helmet

Avec 5 vaccins, vous protégez votre enfant contre 12 maladies

à 2 mois à 3 mois à 4 mois à 15 mois

Vaccin HEXYON® (4 doses)
protège contre 6 maladies :



Diphthérie : infection de la gorge qui rend la respiration difficile.



Tétanos : maladie qui provoque la paralysie des muscles.



Coqueluche : quintes de toux qui sont particulièrement graves chez le petit bébé.



Haemophilus influenzae de type b : microbe qui peut provoquer une méningite.



Poliomyélite : maladie qui provoque des paralysies.



18 mois



Hépatite B : inflammation du foie ; la maladie peut devenir chronique, et évoluer vers une cirrhose et parfois vers un cancer du foie.

à 2 mois à 4 mois à 12 mois

Vaccin SYNFLORIX® (3 doses)
contre le pneumocoque :



Protège contre un microbe qui peut provoquer une pneumonie et parfois une méningite.

à 2 mois à 3 mois à 4 mois*

Vaccin Rotarix® (2 doses)
ou **Rotateq®** (3 doses*) contre
le **ROTAVIRUS** : (Pas gratuit)



Protège contre un microbe qui provoque de graves diarrhées.

à 12 mois

Vaccin RRO (M-M-R-VAXPRO®), 1 dose)
protège contre 3 maladies :



Rougeole : maladie qui provoque une forte fièvre, un état d'abattement important, des boutons rouges sur tout le corps, et qui peut se compliquer en otite, pneumonie ou encéphalite.



Rubéole : maladie qui s'accompagne de boutons sur tout le corps, surtout très dangereuse pour les femmes pendant le début de la grossesse car elle provoque des malformations du bébé.



Oreillons : maladie qui provoque un gonflement douloureux sous les oreilles. Elle entraîne souvent une méningite, parfois une surdité, plus rarement une stérilité.

à 15 mois

Vaccin contre le MÉNINGOCOQUE C
(**NeisVac-C®**, 1 dose) :



Protège contre un microbe qui provoque une méningite.

COMMUNE

À 18 mois, il faut faire compléter le certificat de vaccination contre la polio par un médecin. **Ce certificat doit être remis à la commune car cette vaccination est obligatoire.**

5-6 ANS : le prochain rendez-vous vaccinal de votre enfant.

Pour en savoir plus : www.one.be