

CALENDRIER DE VACCINATION

2019-2020

		Nourrissons					Enfants et adolescents				Adultes		
		8 sem. (2 mois)	12 sem. (3 mois)	16 sem. (4 mois)	12 mois	15 mois ^①	5-6 ans	11-12 ans	13-14 ans	15-16 ans	Femmes enceintes	Tous les 10 ans	65 ans
Poliomyélite	Hexavalent	✓	✓	✓		✓				✓	✓	✓	
Diphtérie							✓			✓	✓	✓	
Tétanos										✓	✓	✓	
Coqueluche										✓	✓	✓	
<i>Haemophilus influenza</i> de type b										✓	✓	✓	
Hépatite B													
Rougeole	R R O				✓				✓				
Rubéole									✓				
Oreillons													
Méningocoque C					✓								
Pneumocoque		✓	✓ ^①	✓	✓							✓	
Rotavirus (vaccin oral)		✓	✓	✓ ^②									
Papillomavirus (HPV)									✓	✓ ^③			
Grippe (Influenza)												✓	



Recommandé à tous et gratuit



Recommandé à tous



Vaccin combiné (une seule injection)

Femmes enceintes : Vaccination à partir de 24 semaines et idéalement avant 32 semaines de grossesse.

Hexavalent : Vaccin qui confère une protection contre 6 maladies

① Pour les bébés nés avant 37 semaines de grossesse ou ayant un poids de naissance inférieur à 2,5 kg, une dose supplémentaire de vaccin contre le pneumocoque est recommandée à 3 mois et les vaccins prévus à 15 mois seront administrés à 13 mois (hexavalent et méningo-coque C).

② En 2 ou 3 doses en fonction du vaccin administré.

③ Vaccination en 2 doses à 6 mois d'intervalle (minimum 5 mois d'écart).

Ce calendrier est susceptible d'être modifié au fil des ans.

Votre médecin pourra éventuellement l'adapter à votre enfant, n'hésitez pas à discuter vaccination avec lui.

Pour plus d'infos :

Consultez votre médecin traitant ou le site

www.vaccination-info.be

