

# CALENDRIER DE VACCINATION

## 2019-2020

		Nourrissons					Enfants et adolescents				Adultes		
		8 sem. (2 mois)	12 sem. (3 mois)	16 sem. (4 mois)	12 mois	15 <sup>①</sup> mois	5-6 ans	11-12 ans	13-14 ans	15-16 ans	Femmes enceintes	Tous les 10 ans	65 ans
Poliomyélite	Hexavalent	✓	✓	✓		✓				✓	✓	✓	
Diphtérie							✓			✓	✓	✓	
Tétanos						✓				✓	✓	✓	
Coqueluche						✓				✓	✓	✓	
<i>Haemophilus influenza</i> de type b						✓				✓	✓	✓	
Hépatite B													
Rougeole	R R O				✓								
Rubéole								✓					
Oreillons									✓				
Méningocoque C					✓								
Pneumocoque		✓	✓ <sup>①</sup>	✓	✓							✓	
Rotavirus (vaccin oral)		✓	✓	✓ <sup>②</sup>									
Papillomavirus (HPV)								✓	✓ <sup>③</sup>				
Grippe (Influenza)										✓		✓	

✓ Recommandé à tous et gratuit

✓ Recommandé à tous

✓ Vaccin combiné (une seule injection)

**Femmes enceintes** : Vaccination à partir de 24 semaines et idéalement avant 32 semaines de grossesse.

**Hexavalent** : Vaccin qui confère une protection contre 6 maladies

① Pour les bébés nés avant 37 semaines de grossesse ou ayant un poids de naissance inférieur à 2,5 kg, une dose supplémentaire de vaccin contre le pneumocoque est recommandée à 3 mois et les vaccins prévus à 15 mois seront administrés à 13 mois (hexavalent et méningo-coque C).

② En 2 ou 3 doses en fonction du vaccin administré.

③ Vaccination en 2 doses à 6 mois d'intervalle (minimum 5 mois d'écart).

Ce calendrier est susceptible d'être modifié au fil des ans.

Votre médecin pourra éventuellement l'adapter à votre enfant, n'hésitez pas à discuter vaccination avec lui.

**Pour plus d'infos :**

Consultez votre médecin traitant ou le site

[www.vaccination-info.be](http://www.vaccination-info.be)

