EN PRATIQUE

Qui peut vacciner?

- Votre médecin généraliste ;
- L'équipe de Promotion de la Santé à l'École; L'équipe vérifie le statut vaccinal des élèves à chaque bilan de santé.

Selon les âges, elle peut proposer une vaccination prévue dans le calendrier vaccinal ou un rattrapage ; ou vous proposer de prendre contact avec votre médecin traitant.

Qu'allez-vous payer?

- ➤ Les vaccins sont gratuits et fournis directement par le professionnel de santé qui participe au Programme de vaccination. Il ne faut pas l'acheter en pharmacie.
- Seuls les éventuels frais de consultation (chez le médecin généraliste, le pédiatre etc.) sont à votre charge.
- > Vous n'aurez aucun frais dans le cadre de la Promotion de la Santé à l'Ecole





FOCUS

La rougeole, une maladie encore bien présente chez nous.

- La rougeole est une des maladies infectieuses les plus contagieuses. Elle est causée par un virus.
- ➤ La rougeole met de 7 à 14 jours avant de se déclarer. Les symptômes sont : nez qui coule, yeux enflammés, suivis très rapidement d'une forte fièvre, de l'apparition de taches rouges sur la peau, d'un malêtre général et de toux.
- Elle peut toucher tout le monde et donner lieu à des complications sévères, tant chez les enfants que chez les adultes, dans près de 40% des cas.
 - Les complications peuvent survenir au niveau du système respiratoire ou neurologique: pneumonies, bronchites, otites, encéphalites ...
- Les antibiotiques ne sont d'aucune utilité pour combattre la rougeole sauf pour traiter les éventuelles complications.

Pour plus d'informations, consultez votre médecin traitant ou le site : www.vaccination-info.be



Le système de commande de vaccins, et d'encodage des données vaccinales, utilisé par les vaccinateurs dans le cadre du Programme, se nomme e-vax.

Ce système permet d'enregistrer les dates de vaccination et de constituer le registre vaccinal permettant le suivi de votre vaccination.

Les données sont gérées dans le respect de la loi relative à la protection de la vie privée.

Si vous ne souhaitez pas que vos données vaccinales soient encodées, informez-en votre vaccinateur.









A CHAQUE ÂGE SA VACCINATION!

La vaccination de transition Rougeole-Rubéole-Oreillons à 11-12 ans

Programme de vaccination de la Fédération Wallonie-Bruxelles

édition **2020**

Pourquoi changer l'âge de la vaccination RRO ?

En avril 2019, le Conseil Supérieur de la Santé a recommandé de changer l'âge de l'administration de la $2^{\rm ème}$ dose du vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons (RRO).


À partir de cette rentrée scolaire 2020, un changement est donc apporté au calendrier vaccinal. Dorénavant la 2ème dose du vaccin contre RRO est réalisée à l'âge de 7-8 ans (2ème primaire) au lieu de 11-12 ans (6ème primaire) précédemment.

Le changement d'âge est recommandé afin de mieux contrôler l'élimination de la rougeole dans notre pays.

Pourquoi une vaccination de transition?

Pour s'assurer que tous les enfants reçoivent la deuxième dose du vaccin contre RRO.

Abaisser l'âge d'une vaccination a pour conséquence que tous les enfants compris entre l'ancien âge et le nouvel âge ne sont plus vaccinés. Or, les enfants âgés de 11-12 ans, qui ne sont plus visés par le calendrier, doivent également être vaccinés pour être complétement protégés contre la rougeole.



La vaccination de transition Rougeole-Rubéole-Oreillons en PSE

Niveau scolaire	Année scolaire 2020-2021	Année scolaire 2021-2022	Année scolaire 2022-2023	Année scolaire 2023-2024
2 ^{ème} primaire (7-8 ans)	Vaccination RR02*	Vaccination RR02*	Vaccination RR02*	Vaccination RR02*
3 ^{ème} primaire (8-9 ans)				
4 ^{ème} primaire (9-10 ans)				
5 ^{ème} primaire (10-11 ans)		•		Ō
6 ^{ème} primaire (11-12 ans)	Vaccination de transition RR02*			

* RRO2 = 2^{ème} dose de vaccin RRO

Les enfants inscrit en 3^{ème}, 4^{ème} et 5^{ème} primaires en 2020-2021 auront la possibilité d'être vaccinés en 2021-2022-2023-2024 lorsqu'ils seront en 6^{ème} primaire.

Quels vaccins sont à faire à 11-12 ans?

1 injection du vaccin contre la rougeole, rubéole, oreillons (RRO).



En retard de vaccination?

Un rattrapage de vaccination en 1 injection des enfants n'ayant pas encore reçu la première dose vaccin contre RRO. Pour être bien vacciné, un enfant doit avoir reçu 2 doses de vaccin contre le RRO avec au moins 1 mois d'écart.

REMARQUE: si cette vaccination est réalisée par votre médecin traitant, celle-ci peut être administrée dès l'âge de 7 ans. Conservez soigneusement la preuve de cette vaccination pour pouvoir en informer le service en charge de la Promotion de la Santé à l'École.