

# À CHAQUE ÂGE SA VACCINATION!

La vaccination de transition Rougeole-Rubéole-Oreillon à 11-12 ans

Programme de vaccination de la Fédération Wallonie-Bruxelles

édition **2022** 

# Pourquoi changer l'âge de la vaccination RRO ?



En avril 2019, le Conseil Supérieur de la Santé a recommandé de changer l'âge de l'administration de la 2<sup>ème</sup> dose du vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons (RRO).


Depuis la rentrée scolaire 2020, le calendrier vaccinal a subi un changement. Dorénavant la 2ème dose du vaccin contre RRO est réalisée à l'âge de 7-8 ans (2ème primaire) au lieu de 11-12 ans (6<sup>ème</sup> primaire) précédemment.

Le changement d'âge est recommandé afin de mieux maîtriser l'élimination de la rougeole dans notre pays.

## Pourquoi une vaccination de transition?

Pour s'assurer que tous les enfants reçoivent la 2ème dose du vaccin contre RRO.

Abaisser l'âge d'une vaccination a pour conséquence que tous les enfants compris entre l'ancien âge et le nouvel âge ne sont plus vaccinés. Or, les enfants âgés de 11-12 ans, qui ne sont plus visés par le calendrier, doivent également être vaccinés pour être complétement protégés contre la rougeole.



La vaccination de transition Rougeole-Rubéole-Oreillons en Services de Promotion de la Santé à l'École (PSE)

Niveau scolaire	Année scolaire 2020-2021	Année scolaire 2021-2022	Année scolaire 2022-2023	Année scolaire 2023-2024
2 <sup>ème</sup> primaire (7-8 ans)			Vaccination RR02*	Vaccination RR02*
3 <sup>ème</sup> primaire (8-9 ans)	68>			
4 <sup>ème</sup> primaire (9-10 ans)	(8)			
5 <sup>ème</sup> primaire (10-11 ans)			1.	4
6 <sup>eme</sup> primaire (11-12 ans)	Vaccination de transition RR02*	Vaccination de transition RR02*	Vaccination de transition RR02*	Vaccination de transition RR02*

\* RRO2 = 2ème dose de vaccin RRO

Les enfants inscrits en 3<sup>ème</sup>, 4<sup>ème</sup> et 5<sup>ème</sup> primaires en 2020-2021 auront la possibilité d'être vaccinés en 2021-2022-2023-2024 lorsqu'ils seront en 6<sup>ème</sup> primaire.

Quels vaccins sont recommandés à 11-12 ans?

1 injection du vaccin contre la rougeole, rubéole, oreillons (RRO).



#### En retard de vaccination?

Un rattrapage de vaccination en 2 injections des enfants n'ayant pas encore reçu la première dose vaccin contre RRO. Pour être bien vacciné, un enfant doit avoir reçu 2 doses de vaccin contre le RRO avec au moins 1 mois d'écart.

**REMARQUE**: si cette vaccination est réalisée par votre médecin traitant, celle-ci peut être administrée dès l'âge de 7 ans. Conservez soigneusement la preuve de cette vaccination pour pouvoir en informer le service en charge de la Promotion de la Santé à l'École.

#### **EN PRATIQUE**

# Qui peut vacciner?

- Votre médecin généraliste ;
- L'équipe de Promotion de la Santé à l'École; L'équipe vérifie le statut vaccinal des élèves à chaque bilan de santé. Selon les âges, elle peut proposer une vaccination

Selon les âges, elle peut proposer une vaccination prévue dans le calendrier vaccinal ou un rattrapage; ou vous proposer de prendre contact avec votre médecin traitant.

### Qu'allez-vous payer?

- Les vaccins sont gratuits et fournis directement par le professionnel de santé qui doit les commander auprès du Programme de vaccination. Il ne faut pas l'acheter en pharmacie.
- Seuls les éventuels frais de consultation (chez le médecin généraliste, le pédiatre, etc.) sont à votre charge.
- Vous n'avez aucun frais en consultation ONE ou dans le cadre de la Promotion de la Santé à l'Ecole.





# **FOCUS**

#### La rougeole, une maladie encore bien présente chez nous.

- La rougeole est une des maladies infectieuses les plus contagieuses. Elle est causée par un virus.
- ➤ La rougeole met de **7 à 14 jours** avant de se déclarer. Les symptômes sont: nez qui coule, yeux enflammés, suivis très rapidement d'une forte fièvre, de l'apparition de taches rouges sur la peau, d'un mal-être général et de toux.
- Elle peut toucher tout le monde et donner lieu à des complications sévères, tant chez les enfants que chez les adultes, dans près de 30% des cas.
  Les complications peuvent survenir au niveau du système respiratoire ou neurologique: pneumonies, bronchites, otites, encéphalites...
- Les antibiotiques ne sont d'aucune utilité pour combattre la rougeole sauf pour traiter les éventuelles complications.

## Pour plus d'informations, consultez votre médecin traitant ou le site : www.vaccination-info.be



Le système de commande de vaccins, et d'encodage des données vaccinales, utilisé par les vaccinateurs dans le cadre du Programme, se nomme e-vax.

Ce système permet d'enregistrer les dates de vaccination et de constituer le registre vaccinal permettant le suivi de votre vaccination.

Les données sont gérées dans le respect de la loi relative à la protection de la vie privée.

Si vous ne souhaitez pas que vos données vaccinales soient encodées, informez-en votre vaccinateur.





