

EN PRATIQUE

Qui peut vacciner ?

- Votre pédiatre ;
- Votre médecin généraliste ;
- L'équipe d'une consultation ONE (jusqu'à 6 ans révolus) ;
- L'équipe de Promotion de la Santé à l'École ;
L'équipe vérifie le statut vaccinal des élèves à chaque bilan de santé.
Selon les âges, elle peut proposer une vaccination prévue dans le calendrier vaccinal ou un rattrapage ;
ou vous proposer de prendre contact avec votre médecin traitant.

Qu'allez-vous payer ?

- Les vaccins sont gratuits et fournis directement par le professionnel de santé qui doit les commander auprès du Programme de vaccination. Il ne faut pas l'acheter en pharmacie.
- Seuls les éventuels frais de consultation (chez le médecin généraliste, le pédiatre, etc.) sont à votre charge.
- Vous n'avez aucun frais en consultation ONE ou dans le cadre de la Promotion de la Santé à l'École.



FOCUS

La rougeole, une maladie encore bien présente chez nous.

- La rougeole est une des maladies infectieuses les plus contagieuses. Elle est causée par un virus.
- La rougeole met de **7 à 14 jours** avant de se déclarer. Les symptômes sont: nez qui coule, yeux enflammés, suivis très rapidement d'une forte fièvre, de l'apparition de taches rouges sur la peau, d'un mal-être général et de toux.
- Elle peut toucher tout le monde et donner lieu à des **complications** sévères, tant chez les enfants que chez les adultes, dans près de **30%** des cas. Les complications peuvent survenir au niveau du système respiratoire ou neurologique: pneumonies, bronchites, otites, encéphalites...
- Les antibiotiques ne sont d'aucune utilité pour combattre la rougeole sauf pour traiter les éventuelles complications.

Pour plus d'informations,
consultez votre médecin traitant ou le site :
www.vaccination-info.be



Le système de commande de vaccins, et d'encodage des données vaccinales, utilisé par les vaccinateurs dans le cadre du Programme, se nomme e-vax.

Ce système permet d'enregistrer les dates de vaccination et de constituer le registre vaccinal permettant le suivi de votre vaccination.

Les données sont gérées dans le respect de la loi relative à la protection de la vie privée.

Si vous ne souhaitez pas que vos données vaccinales soient encodées, informez-en votre vaccinateur.

Editeur responsable : Laurent Morriez - Chaussée de Charleroi 95 - 1060 Bruxelles - DCE0020 - D/2023/74.80/07



5/6
ans

7/8
ans

À CHAQUE ÂGE SA VACCINATION !

La vaccination à 5-6 ans et 7-8 ans



Pourquoi vacciner ?

➤ Pour se protéger contre certaines maladies.

Les vaccins utilisés dans le Programme de vaccination contiennent des fragments d'un virus ou d'une bactérie, ou une faible quantité de ceux-ci tués ou affaiblis. Grâce aux vaccins, le système immunitaire se prépare à les reconnaître et à les combattre. S'il les rencontre encore une fois, il pourra plus facilement les neutraliser.

➤ Pour protéger les autres contre certaines maladies.

Quelques personnes ne peuvent pas être vaccinées : nourrissons trop jeunes, personnes pour lesquelles c'est médicalement contre-indiqué. Plus il y a de personnes vaccinées contre une maladie, moins le virus ou la bactérie circulent dans la population, ce qui protège notamment les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées.

Des réactions sont-elles possibles ?

Certains effets indésirables sont possibles. Ils sont généralement **sans gravité** : rougeurs, légère douleur à l'endroit où l'injection du vaccin est faite et fièvre de courte durée.

Ces réactions disparaissent après quelques jours au maximum.

Pour plus d'informations, consultez votre médecin traitant ou le site: www.vaccination-info.be

Calendrier de vaccination 2023-2024

		Nourrissons					Enfants et adolescents			
		8 sem. (2 mois)	12 sem. (3 mois)	16 sem. (4 mois)	12 mois	15 mois	5-6 ans	7-8 ans	11-14 ans	15-16 ans
Hexavalent	Poliomyélite	✓	✓	✓		✓	✓			✓
	Diphtérie	✓	✓	✓		✓	✓			✓
	Tétanos	✓	✓	✓		✓	✓			✓
	Coqueluche	✓	✓	✓		✓	✓			✓
	Haemophilus influenza de type b	✓	✓	✓		✓	✓			✓
	Hépatite B	✓	✓	✓		✓	✓			✓
RRO	Rougeole				✓			✓		
	Rubéole				✓			✓		
	Oreillons				✓			✓		
Méningocoques						✓				
Pneumocoque		✓	✓	✓	✓					
Rotavirus (vaccin oral)		✓	✓	✓						
Papillomavirus (HPV)									✓	✓

Ce calendrier est susceptible d'être modifié au fil des ans. Il peut éventuellement être adapté à votre enfant, parlez-en avec votre médecin.

- ✓ Recommandé à tous et gratuit
- ✓ Recommandé à tous, remboursé mais pas gratuit
- ✓ Vaccin combiné (une seule injection)

① Depuis septembre 2020, la deuxième dose du vaccin RRO est administrée à 7-8 ans. Les enfants plus âgés qui n'ont pas encore reçu la vaccination peuvent être vaccinés à 11-12 ans.

② Vaccination en 2 doses à 6 mois d'intervalle (minimum 5 mois d'écart)

Hexavalent :

Vaccin qui confère une protection contre 6 maladies.

Bon à savoir !

Depuis 2020, la 2ème dose de RRO est passée de 11-12 ans à 7-8 ans.

Quels vaccins sont recommandés à 5-6 ans ?

1 injection d'un vaccin contre **la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos et la coqueluche.**

! En retard de vaccination ?

Un **ratissage** en 1 injection pour les enfants **n'ayant pas encore reçu** la première dose de vaccin contre la rougeole-rubéole-oreillons (RRO).

Ce ratissage peut se faire à n'importe quel âge et doit être réalisé dès que possible.

Quels vaccins sont recommandés à 7-8 ans ?

1 injection d'un vaccin contre **la rougeole, la rubéole et les oreillons.**

! En retard de vaccination ?

Un **ratissage** pour les enfants qui ne sont pas encore en ordre de :

- la première dose du vaccin contre la rougeole-rubéole-oreillons (RRO);
- la vaccination contre la méningite;
- la vaccination contre la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos et la coqueluche.