


LA COQUELUCHE

La coqueluche est une infection respiratoire due à une bactérie (*Bordetella pertussis*). Elle très contagieuse et se transmet via des gouttelettes de salive lors de la toux ou des éternuements.

La maladie se caractérise par des quintes de toux sévères et persistantes durant plusieurs semaines. Particulièrement chez le jeune nourrisson (moins de 3 mois), la toux peut s'aggraver et conduire à l'hospitalisation. Les personnes qui sont les plus à risque de l'attraper sont les personnes insuffisamment vaccinées (vaccinés il y a plus de 10 ans ou nourrissons trop jeunes pour être vaccinés). Les enfants sont le plus souvent contaminés par un adulte : il s'agit de l'un des parents dans environ 50% des cas.

CONSÉQUENCES DE LA COQUELUCHE



COMMENT SE PROTÉGER DE LA COQUELUCHE ?

- LA VACCINATION DIPHTÉRIE-TÉTANOS-COQUELUCHE DE LA FEMME ENCEINTE À CHAQUE GROSSESSE
- LA VACCINATION HEXAVALENTE DES NOURRISSONS À PARTIR DE 2 MOIS
- LA VACCINATION DE RAPPEL À 5-6 ANS ET 15-16 ANS

La maladie, comme la vaccination, ne protège pas à vie : il est possible d'attraper plusieurs fois la coqueluche, d'où l'utilité de faire les rappels recommandés dans le calendrier des vaccinations.